

Colirio

Coltix
ADVANCE



**DESCONGESTIVO Y
LUBRICANTE OCULAR**

Tetrahidrozolina · Povidona
Polietilenglicol 400 · Dextran 70

Cont. Neto 12 ml · Venta Libre · Industria Argentina

¿QUE CONTIENE COLTIX ADVANCE?

Cada 100 ml. contiene como Ingredientes Activos: Tetrahidrozolina clorhidrato 50 mg, Polietilenglicol 400 1 g, Povidona 1 g, Dextran 70 100 mg.

Ingredientes Inactivos: Edetato disódico, Ácido bórico, Borato de sodio, Polihexanida clorhidrato, Cloruro de sodio, Agua purificada.

ACCION

Descongestivo y lubricante ocular.

¿PARA QUE SE USA COLTIX ADVANCE?

Lea detenidamente esta información

Coltix Advance es un descongestivo y lubricante ocular para el alivio temporario del malestar y el enrojecimiento, debido a irritaciones oculares leves.

Disminuye los signos de irritación ocular (ardor, picazón y enrojecimiento) provocados por el polvo, vientos fuertes, humo, polución ambiental, cloro de la pileta, exposición prolongada a pantallas de TV o computadoras u otros irritantes externos.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR COLTIX ADVANCE?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de sus ingredientes o a otros descongestivos oculares. No utilizar en niños, embarazadas y mujeres en período de lactancia. No emplear en pacientes con glaucoma o con infecciones microbianas oftálmicas. No utilizar en pacientes tratados con IMAO. Si usted está tomando o aplicándose otros medicamentos o ante cualquier duda consulte con su médico.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE APLICARME ESTE MEDICAMENTO?

Si usa lentes de contacto debe quitárselos antes de aplicar Coltix Advance y puede volver a colocárselos 15 minutos después. Si Ud. recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si se presenta dolor a nivel ocular, cambios en la visión, incremento de la irritación o si la afección persiste luego de 3 días de tratamiento, suspenda la aplicación y consulte al oftalmólogo.

Puede producir picazón o ardor ocular. Ocasionalmente se han descrito cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. En estos casos se deberá suspender el tratamiento. La aplicación excesiva de descongestivos oftálmicos, puede aumentar el enrojecimiento ocular.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

Para la correcta colocación de las gotas oftálmicas, se sugiere inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás, separar los párpados, dirigir la mirada hacia arriba y colocar 1 ó 2 gotas dentro del párpado inferior. Mantener los ojos abiertos durante algunos segundos y luego parpadear normalmente.

El orificio del frasco gotero no debe tocar con el ojo ni tocarse con los dedos. Cierre correctamente el frasco luego de cada aplicación. Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

Posología y forma de administración:

Coltix Advance está indicado solo en adultos. La dosis media terapéutica es de 1 a 2 gotas en el ojo u ojos afectados, hasta 4 veces al día.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA INGESTION ACCIDENTAL O SI ME APLIQUE MAYOR CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental concurra al hospital más cercano o comuníquese con alguno de los siguientes Centros de Toxicología:

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777

HOSPITAL R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A COLTIX ADVANCE?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

o 800 444 72666

O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE:

o800 333 1234

PRESENTACIONES:

Envases con 12 ml.

CONSERVACION:

Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30°C).

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 57.644.

Elaborado en Int. A. Ávalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Gramon Millet S.A.

Fray Justo Sarmiento 2350, B1636AKJ,

Olivos, Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

FECHA DE ULTIMA REVISION:

Abril 2015.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO UTILIZAR LUEGO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENGA EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL Y CONSERVE EL PROSPECTO.

 gramon millet